Послеродовые заболевания матки	Этиология	Клинические признаки	Сроки и частота выявляемых патологий	Лечение
Задержка последа	Многоплодие, мертворожденный телёнок, аборт, фетотомия, нарушения кормления коровы, увеличение возраста и сезонные эффекты (Laven and Peters, 1996; Beagley et al., 2010), нарушение обмена веществ, поражение кормов микотоксинами.	Послед не отделяется самостоятельно 12 – 24 часа после отела	24 часа после отела: 4-12 %	Ручное отделение последа (не рекомендуется) Медикаментозная стимуляция отделения последа, антибактериальная терапия
Клинический метрит	Способствует возникновению метрита многоплодие, мертвый плод, нарушение обмена веществ, поражение кормов микотоксинами.	**Бывает 3 степеней** по тяжести протекания : 1- Аномально увеличенная атоничная матка, без системных признаков (Sheldon et al., 2006). 2- Повышение температуры тела болезни ≥39,5^{0}C, снижение удоя, угнетение., признаки интоксикации. Зловонные, от красно-коричневых водянистых до белесоватых вязких выделений из половых путей коровы. 3- Токсический метрит проявляетя как и 2 степени, осложняется признаками интоксикации (отсутствие аппетита, похолодание конечностей, коллапс.	В течение 21 д. после отела. Обычно выявляются к концу первой недели после отела: 5-15%	Антибатериальные внутриматочные средства. Общая антибиотикотерапия в случае стойкого повышения температуры. Дезинтоксикационная и витаминная поддерживающая терапия.

Клинические эндометриты	Нарушение обмена веществ, поражение кормов микотоксинами, ослабление иммунитета.	Местное воспаление эндометрия (клинический эндометрит) Выделения гнойных белесоватых, зловонных выделений из половых путей коровы Отсутствие общих симптомов (лихорадка).	≥21 дня после отёла: 20-30%	Внутриматочные антибиотики ≥26 после отела $PGF_{2\alpha}$
Пиометра	Осложнения родового процесса, травмирование матки, снижение иммунитета коровы нарушение обмена веществ, поражение кормов микотоксинами.	Наличие гнойного эксудата в полости матки вплоть до её вздутия ; желтое тело есть; шейка матки часто закрыта.	Зависит от времени овуляции после отела: 1-2%	Две дозы $PGF_{2\alpha}$ с интервалом 11-14 дней
Цитологический скрытый эндометрит	Нарушение обмена веществ, поражение кормов микотоксинами, нарушения иммунитета коров.	Ненормальное присутствие PMN в цитологических образцах Отсутствие клинических признаков гнойных вагинальных выделений.	Диагностируется между 21-64 д. после отела или во время ИО 9-76%, обычно 25-35%	Внутриматочные антибиотики или $PGF_{2\alpha}$ (одновременно) Терапевтическое промывание матки антибактериальными растворами